



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(Ν 141(I)/2011 και Ν 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την αίτηση με αρ. 831 (Έντυπο 09), ημερομηνίας 25/01/2024, για τροποποίηση της άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος, σε σχέση με τα εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος,
- την αίτηση με αρ. 210 (Έντυπο 10), ημερομηνίας 04/06/2024, για τροποποίηση της άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος, σε σχέση με τα μεγέθη συσκευασιών του σκευάσματος,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **KING** ως ακολούθως:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

2734

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

21/02/2025

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/12/2025

2. Κάτοχος της άδειας:

DIACHEM S.p.A.

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:
(εφόσον είναι διαφορετικός από τον
κάτοχο άδειας)

L. Lambrou Agro Ltd

4. Διανομέας / Διανομείς:

L. Lambrou Agro Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: King

2. Μορφή: Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Μεταλλικός χαλκός: 360g/L
(σε μορφή τριβασικού θειϊκού χαλκού 679.2 g/L)
Βοηθητικές ουσίες μέχρι 100% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

DIACHEM S.p.A.

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

DIACHEM S.p.A.

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1. DIACHEM S.p.A., Ιταλία
2. L. Lambrou Agro Ltd, Κύπρος

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλες	125κ.εκ., 250 κ.εκ - 1 λίτρο	HDPE (πολυαιθυλαίνιο υψηλής πυκνότητας)
2	Δοχεία	3-20 λίτρα	HDPE (πολυαιθυλαίνιο υψηλής πυκνότητας)

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Copper sulfate tri-basic

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

Copper sulfate tri-basic: >95% β/β min, ισοδύναμο με 53% μεταλλικό χαλκό

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

Manica SpA

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Manica SpA

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης: Ανόργανο μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες



ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά, προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα στο νερό αναδεύοντας και συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Ασθένεια που ελέγχεται	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη		
Εσπεριδοειδή	Κορυφοξήρα (<i>Deuterophoma tracheifila</i>) Ανθράκωση (<i>Ascochyta spp.</i>) Καπνιά της ελιάς (<i>Capnodium spp.</i> , <i>Cladosporium spp.</i>) Μελανή κηλίδωση (<i>Phytophthora spp.</i>) Βακτηρίωση (<i>Pseudomonas syringae</i>)	250 – 300	100	300	3 εφαρμογές: στο τέλος του χειμώνα/την αρχή της άνοιξης και το φθινόπωρο (ωρίμανση των φρούτων)	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 – 10 ημέρες
Αμπέλι (επιτραπέζια και οиноποιήσιμα σταφύλια)	Περονόσπορο (<i>Plasmopara viticola</i>) Μελανή κηλίδωση (<i>Guignarda bidwelli</i>)	200 – 250	100	250	Εφαρμογές πριν την άνθηση και από το τέλος της άνθησης μέχρι την συγκομιδή	5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7
Φουντουκιά	Βακτηριακό κάψιμο (<i>Xanthomonas corylina</i>) (<i>Cytospora corylicola</i>) Νέκρωση (<i>Pseudomonas avellanae</i>)	350 (φθινόπωρο) 100 – 150 (άνοιξη)	100	350 (φθινόπωρο) 150 (άνοιξη)	για τις φθινοπωρινές επεμβάσεις: (μέγιστο 2 κάθε 12-14 μέρες) για τις ανοιξιάτικες επεμβάσεις: (μέγιστο 3 κάθε 7-10 μέρες).	
Καρυδιά	Ανθράκωση (<i>Gnomonia leptostyla</i>) Βακτηρίωση	350 (φθινόπωρο) 100 – 150 (άνοιξη)	100	350 (φθινόπωρο) 150 (άνοιξη)	2 εφαρμογές κατά την χειμερινή περίοδο κάθε 12-14 ημέρες 3 εφαρμογές κατά την περίοδο της άνοιξης-καλοκαιριού με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 – 10 ημέρες	
Ακτινιδιά	Βακτηρίωση (<i>Pseudomonas syringae</i>)	300 – 350 (φθινόπωρο) 110 – 150 (άνοιξη)	100	350	1 – 2 εφαρμογές κατά την πτώση των φύλλων με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-10 ημερών. 3- 4 εφαρμογές στη βλάστηση, η άνθηση εξαιρείται, με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες.	
Καπνός	Περονόσπορο (<i>Peronospora tabacina</i>) Βακτηρίωση	250	50 - 80	250	Εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας	4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 – 10 ημέρες

Πατάτα	Περωνόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) Αλτερνάρια (<i>Alternaria spp</i>)	200 – 250	50 – 80	250	Εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας	6 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες
Μηλοειδή Μηλιά Αχλαδιά Κυδωνιά	Καρκινώματα και ξηράνσεις λόγω ανεπάρκειας χαλκού (<i>Neonectria galligena</i> , <i>Phomopsis sp.</i> , <i>Sphaeropsis sp.</i>)	350	100	350	2-3 εφαρμογές το φθινόπωρο ή/και στο τέλος του χειμώνα, με μεσοδιάστημα εφαρμογής 8 – 10 ημέρες	
	Φουζικλάδιο (<i>Venturia pirina</i>) Βακτηριώση	175 (διόγκωση οφθαλμών) 150 (πριν την ανθοφορία ή μετά το τέλος)		175	5 εφαρμογές, σε διογκωμένο οφθαλμό πριν την ανθοφορία και μετά το τέλος της ανθοφορίας, με μεσοδιάστημα εφαρμογής 8 – 10 ημέρες	
	Μαύρη κηλίδωση της αχλαδιάς (<i>Stemphylium vesicarium</i>)	110		110	6 εφαρμογές από το τέλος της ανθοφορίας, με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 – 10 ημέρες)	
	Βακτηριακό κάψιμο (<i>Erwinia amylovora</i>)	100		100	8 εφαρμογές, 30 μέρες μετά την πτώση των πετάλων με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημερών.	
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Βερικοκιά Κερασιά Ροδακινιά Δαμασκηινιά	Βακτηριώσεις (<i>Xanthomonas spp.</i>)	350	100	350	2 – 3 εφαρμογές μετά την πτώση των φύλλων με μεσοδιάστημα εφαρμογής 8-10 ημερών	
	Monilia (<i>Monilia spp.</i>) (<i>Fusicoccum amygdali</i>) (<i>Taphrina deformans</i>) <i>Leucostoma spp.</i> Κορύνηο (<i>Coryneum beijerinckii</i>)	350	100	350	3 εφαρμογές κατά το λήθαργο με μεσοδιάστημα εφαρμογής 12 – 14 ημερών	
	Βακτηριώσεις (<i>Xanthomonas spp.</i> , <i>Pseudomonas spp.</i>)	55	100	55	4 -5 εφαρμογές κατά την ανάπτυξη με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 ημερών	

Ελιά	Καρκίνωση <i>(Pseudomonas savastanoi)</i> Κυκλοκόνιο <i>(Spilocaea oleagina)</i> βακτήρια <i>(Agrobacterium sp.)</i> Εξώασκο/ανθράκωση <i>(Colletotrichum gloeosporioides=Gloeosporium olivarum)</i>	250 – 300	100	300	από την αρχή της ανάπτυξης των καρπών έως την ωρίμανση των φρούτων	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 – 10 ημέρες
Σπαράγγια (Υπαίθρου)	Αλτερνάρια <i>(Alternaria spp.)</i> Σκωρίαση <i>(Puccinia asparagi)</i> Κερκοσπορίωση <i>(Cercospora asparagi)</i> Βακτηρίωση	175 – 200	50 – 80	200	ψεκασμοί αποκλειστικά μετά τη συγκομιδή των βλαστών	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 – 10 ημέρες
Φράουλα (Υπαίθρου)	<i>(Mycosphaerella fragariae)</i> Περονόσπορος Φυτόφθορα λαιμού και ριζών <i>(Phytophthora cactorum)</i> Ανθράκωση <i>(Colletotrichum spp.)</i> βακτηρίωση <i>(Xanthomonas fragariae)</i>	200 – 250	50 – 80	200	Εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας	4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες

ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Κολοκυνθσειδή με βρώσιμο φλοιό και μη βρώσιμο φλοιό (Y+Θ) (Αγγούρια, Αγγουράκια, Κολοκυθάκια, (Πεπόνια, Κολοκύθες, Καρπούζια) Καρότα (Y), Βολβώδη λαχανικά (Y) Τομάτα (Y+Θ), Μελιτζάνα (Y+Θ), Μπρόκολο (Y), Κουνουπίδι (Y) Κουνουπίδι (Θ) Αγκινάρα (Y) Μαρούλια και άλλα σαλατικά, συμπεριλαμβανομέ- νων των κραμβών (Brassicacea) (Y&Θ) Αντίδια/Ραδίκια με μεγάλα φύλλα, Κάρδαμο, Ρόκα, Λυκοτρίβολο/Βαλερι ανέλλα, καλλιέργειες «baby leaf» (συμπεριλαμβανομέ- νων των κραμβοειδών) (Y&Θ)	Αλτερνάρια (<i>Alternaria</i> spp.) Ανθράκωση (<i>Colletotrichum</i> spp., <i>Marsonnina</i> spp., <i>Ascochyta</i> spp.) Περονόσπορο (<i>Peronospora</i> spp., <i>Pseudoperonospora</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp., <i>Bremia</i> spp., <i>Plasmopara</i> spp.) Σκωρίαση (<i>Puccinia</i> spp., <i>Uromyces</i> spp., <i>Albugo candida</i>) Σεπτορίωση (<i>Septoria</i> spp.) Κλαδοσπορίωση (<i>Cladosporium</i> spp.) Κερκοσπορίωση (<i>Cercospora</i> spp.) Βακτηρίωση	175 – 200	50 – 80	200	Εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας	6 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες
--	--	-----------	---------	-----	--	---

Καλλωπιστικά Φυτά Ανθοκομικά Άνθη Δασικά Δέντρα	Σκωρίαση <i>(Uromyces, Phragmidium spp., Melampsora spp.)</i> <i>Marsonnina brunnea,</i> Φουζικλάδιο <i>(Diplocarpon rosae, Venturia spp., Fusicladium spp., Marsonnina spp.)</i> Περνόςπορο <i>(Phytophthora, Peronospora spp., Bremia spp.)</i> Κερκοσπορίωση <i>(Cercospora spp.)</i> Βακτηρίωση Σεπτορίωση <i>(Septoria spp.)</i> Αλτερνάρια <i>(Alternaria spp.), τα Καρκινώματα λόγω ανεπάρκειας χαλκού (Nectria spp.),</i> Ανθράκωση <i>(Colletotrichum spp., Guignarda spp., Apiognomonina spp.)</i> Ταφρίνα <i>(Taphrina spp.)</i> Καρκίνος κυπαρισσιού <i>(Seiridium cardinale)</i>	200 – 250	100 50 – 80 (Ανθοκομικά Άνθη)	Εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας	4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 – 10 ημέρες
		150 – 200 (Ανθοκομικά Άνθη)			

Παρατηρήσεις:

Οι δόσεις ανά εκατόλιτρο νερού αναφέρονται σε φυσιολογικούς όγκους ψεκασμού, που αντιστοιχούν σε 100 l/δεκάριο νερού σε καρποφόρες καλλιέργειες και 50-80 l/δεκάριο νερού σε καλλιέργειες χαμηλού ύψους. Σε περίπτωση υιοθέτησης μεγαλύτερων ή μικρότερων όγκων ψεκασμού, να τηρείτε τη δοσολογία που υποδεικνύεται ανά δεκάριο.

Προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο η πιθανή συσσώρευση στο έδαφος και

η έκθεση για τους μη στοχευόμενους οργανισμούς, λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα τις γεωργικές και κλιματολογικές συνθήκες, μην υπερβαίνετε την αθροιστική εφαρμογή 2,8 kg χαλκού ανά δεκάριο σε χρονικό διάστημα 7 ετών.

Συνιστάται να τηρείτε τη μέση εφαρμοσμένη ποσότητα των 400 g χαλκού ανά δεκάριο ετησίως.

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Αμπέλι	21 ημέρες
Μπρόκολο, Κουνουπίδι	14 ημέρες
Μαρούλια και άλλα σαλατικά συμπεριλαμβανομένων των κραμβών, αγκινάρα, πατάτα, Κολοκύθα, Πεπόνι, Καρπούζι, φράουλα	7 ημέρες
Καρότα, τομάτα (Υ&Θ), μελιτζάνα (Υ&Θ), Αγγούρια (Υ&Θ), Αγγουράκια (Υ&Θ), Κολοκυθάκια (Υ&Θ), βολβώδη λαχανικά, φρέσκα λαχανικά (με φλοιό)	3 ημέρες
Υπόλοιπες καλλιέργειες	20 μέρες
Σπαράγγι	Μη εφαρμόσιμο (Καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή)

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: M1

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

- Μην ψεκάζετε κατά τη διάρκεια της άνθησης.
- Μην ψεκάζετε φυτά υπό ακραίες συνθήκες ή σε περίπτωση έντονων μεταβολών της θερμοκρασίας.
- Πιθανά φυτοτοξικά συμπτώματα στους ψεκασμούς σε πλήρη βλάστηση σε βερικοκιές, δαμασκηνιές και ποικιλίες μηλιών και αχλαδιών με ευαισθησία στον χαλκό (π.χ. Μηλιά: Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana. Αχλαδιά: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C.William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard)

10. Συνδυαστικότητα:

Το προϊόν δεν είναι συμβατό με προϊόντα αλκαλικής αντίδρασης.

Προειδοποίηση: σε περίπτωση ανάμιξης με άλλα προϊόντα πρέπει να τηρείτε την μεγαλύτερη περίοδο αναμονής. Επιπλέον, πρέπει να τηρούνται οι θεσπισμένοι κανόνες προφύλαξης για τα πιο τοξικά προϊόντα. Σε περίπτωση δηλητηρίασης, ενημερώστε τον γιατρό για το μίγμα που παρασκευάσατε.

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

- | | |
|-------------|---|
| H317 | Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση |
| H319 | Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό |
| H410 | Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. |

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

- | | |
|------------------|---|
| P405+P102 | Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. |
| P270 | Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. |
| P273 | Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον |
| P280 | Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο |
| P391 | Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα |
| P401 | Αποθηκεύεται μακριά από τρόφιμα ή ζωοτροφές και ποτά |
| P501 | Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. |
| SP1 | Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή το δοχείο του (Μην καθαρίζετε το υλικό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Αποφύγετε τη μόλυνση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης των υδάτων από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και το δικό δίκτυο) |
| SPe3 | Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:
- 10 μέτρα σε καλλιέργειες λαχανικών, πατάτας, καπνού, αμπελιών, φράουλας, δασικές εκμεταλλεύσεις και καλλωπιστικά φυτά
- 10 μέτρα χρησιμοποιώντας ακροφύσια με μείωση της μετατόπισης 50% ή 5 μέτρα χρησιμοποιώντας ακροφύσια με μείωση της μετατόπισης 75% σε καλλιέργειες ακτινιδίων
- 10 μέτρα χρησιμοποιώντας ακροφύσια με μείωση της μετατόπισης 75% ή 20 μέτρα σε ελαιώνες, εσπεριδοειδή
- 20 μέτρα χρησιμοποιώντας ακροφύσια με μείωση της μετατόπισης 75% σε μηλοειδή και πυρηνόκαρπα (πρώιμη εφαρμογή), καρυδιές και φουντουκιές |
| EUH401 | Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. |

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Καλέστε το γιατρό

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν ο παθών έχει χάσει τις αισθήσεις του μην χορηγήσετε τίποτα από το στόμα και μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε το γιατρό

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Απομακρύνετε τον παθόντα από τον χώρο που έγινε η έκθεση και μεταφέρετε τον σε καλά αεριζόμενο χώρο. Καλέστε το γιατρό

Περιέχει 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-tril)trietanol

Συμπτώματα: μετουσίωση των πρωτεϊνών με βλάβες των βλεννογόνων, ηπατική και νεφρική βλάβη και βλάβη του ΚΝΣ, αιμόλυση. Εμετός πράσινου χρώματος, γαστροοισοφαγική καύσος, διάρροια με αίμα, κολικοί εντέρου, αιμολυτικός ίκτερος, ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια, σπασμοί, κατάρρευση. Πυρετός μετά την εισπνοή του μετάλλου. Ερεθισμός δέρματος και οφθαλμών.

Θεραπεία: γαστρική πλύση με διάλυμα λακταλβουμίνης, αν η περιεκτικότητα χαλκού είναι υψηλή χρησιμοποιήστε χηλικό παράγοντα, πενικιλλαμίνη αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη στοματική οδό ή CaEDTA ενδοφλέβια και BAL ενδομυϊκά· για τα υπόλοιπα ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. Συμβουλευτείτε ένα κέντρο δηλητηριάσεων.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε πίσω στο ψεκάστήρα) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 21/02/2025...



Δρ Μάκης Αντωνιάδης
Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα