

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Προϊόντα μεγάλης καλλιέργειας



L. LAMBROU AGRO LTD



Lambrou
Agro Ltd
green is life

Περιεχόμενα

Προϊόντα Μεγάλης Καλλιέργειας (Εισαγωγή).....	2
---	---

Ποικιλίες Σπόρων

Φθινοπωρινής Φύτευσης.....	3-8
Ανοιξιάτικης Φύτευσης.....	9-10

Θρέψη

Λίγα λόγια για τη Yara.....	11
Λιπάσματα Βασικής Λίπανσης.....	12
Λιπάσματα Επιφανειακής Λίπανσης.....	12
Διαφυλλικά Λιπάσματα.....	13

Φυτοπροστασία

Ζιζανιοκτόνα.....	14-15
Εντομοκτόνα.....	16
Εντομοκτόνα Αποθήκευσης Σιτηρών.....	16
Μυκητοκτόνα.....	17
Προσκολλητικές Ουσίες.....	17

Προϊόντα Χορτοδεσίας

Δίχτυα.....	18
Σπάγγοι.....	18
Φιλμ Ενσίρωσης (για μπαλες).....	19
Ασπρόμαυρο φιλμ ενσίρωσης.....	19
Εμβολιαστής Ενσίρωσης GoriSIL.....	20
Υφασμα Προστασίας Σανού και Αχύρου Polytex.....	20
Φιλμ Δεξαμενής.....	20

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ



Η καλλιέργεια σιτηρών και κτηνοτροφικών φυτών (η θρέψη, η φυτοπροστασία, η συγκομιδή και η αποθήκευσή τους) είναι μια σοβαρή δουλειά που δεν σηκώνει εκπτώσεις και πειραματισμούς. Γι' αυτό και εμείς συνεργαζόμαστε με τις καλύτερες εταιρείες παγκοσμίως (YARA, Plant Prod, TAMA, SolPlast, κ.α.) προσπαθώντας να προσφέρουμε τα καλύτερα και πιο ποιοτικά προϊόντα σε εσάς, πάντα στις πιο χαμηλές τιμές.

Επίσης, φροντίζουμε να εκπαιδευόμαστε και να επιμορφωνόμαστε συνεχώς για να βρίσκουμε καινούργια καινοτόμα προϊόντα που θα σας δίνουν λύσεις στα προβλήματα σας. Θέλουμε να σας έχουμε πάντα δίπλα μας και σας υποσχόμαστε ότι θα είμαστε κοντά σας όποτε μας χρειαστείτε.



QR CODES



Χρησιμοποιήστε τα QR codes που βρίσκονται στον κατάλογο, για να μεταβείτε μέσω του κινητού σας σε ενημερωτικά βίντεο στο YouTube για συγκεκριμένα προϊόντα.



Σιτάρι Σκληρό



CALO

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εκατολιτρικό βάρος (kg/hl)	Καλό, 80-85
Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες	Υψηλή
Δείκτης γλουτένης	Εξαιρετικός
Δείκτης κίτρινου χρώματος	Υψηλός
Βάρος 1000 κόκκων (g)	47-52

Προτεινόμενη πυκνότητα σποράς: 22 Kg / δεκ.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στάχυ	Με μαύρα άγανα, συμπαγές
-------	--------------------------

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΟΥ

Αδέλφωμα	Εξαιρετικό
Ύψος φυτού	Μεσαίο
Πρωιμότητα	Μεσοπρώιμη

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ

	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πλάγιασμα	Υψηλή
Κρύο	Χαμηλή
Υψηλές θερμοκρασίες	Πολύ Υψηλή
Οίδιο	Ικανοποιητική
Μαύρη Σκωρίαση	Μεσαία
Σεπτόρια	Ικανοποιητική



CORE

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εκατολιτρικό βάρος (kg/hl)	Καλό
Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες	Υψηλή
Δείκτης γλουτένης	Καλός
Δείκτης κίτρινου χρώματος	Υψηλός

Προτεινόμενη πυκνότητα σποράς: 22 Kg / δεκ.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Στάχυ	Με μαύρα άγανα
Κόκκος	Κεχρμπαρένιος

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΟΥ

Αδέλφωμα	Εξαιρετικό
Ύψος φυτού	Μεσαίο
Πρωιμότητα	Πρώιμη

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ

	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πλάγιασμα	Ικανοποιητική
Κρύο	Ικανοποιητική
Υψηλές θερμοκρασίες	Ικανοποιητική
Οίδιο	Ικανοποιητική
Μαύρη Σκωρίαση	Ικανοποιητική
Σεπτόρια	Ικανοποιητική



MIMMO

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εκατολιτρικό βάρος (kg/hl)	Καλό, 78-82
Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες	Υψηλή
Δείκτης γλουτένης	Καλός
Δείκτης κίτρινου χρώματος	Υψηλός
Βάρος 1000 κόκκων (g)	45-50

Προτεινόμενη πυκνότητα σποράς: 22 Kg / δεκ.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στάχυ	Με μαύρα άγανα
-------	----------------

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΟΥ

Αδέλφωμα	Εξαιρετικό
Παράστημα	Επίμηκες
Ύψος φυτού	Μεσαίο
Πρωιμότητα	Μεσοπρώιμη

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ

	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πλάγιασμα	Υψηλή
Κρύο	Άσπρη
Υψηλές θερμοκρασίες	Ικανοποιητική
Οίδιο	Ικανοποιητική
Μαύρη Σκωρίαση	Μεσαία
Σεπτόρια	Υψηλή



MACISTE

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εκατολιτρικό βάρος (kg/hl)	82-84
Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες	14-15%
Δείκτης γλουτένης	80-85
Βάρος 1000 κόκκων (g)	48-50

Προτεινόμενη πυκνότητα σποράς: 22 Kg / δεκ.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κόκκος	Κόκκινος
--------	----------

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΟΥ

Ύψος φυτού	85-90 cm
------------	----------

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ

	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πλάγιασμα	Ανθεκτική
Κρύο	Ανθεκτική
Υψηλές θερμοκρασίες	Μεσαία
Οίδιο	Καλή
Μαύρη Σκωρίαση	Καλή
Σεπτόρια	Καλή



SIMETO

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εκατολιτρικό βάρος (kg/hl)	Καλό
Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες	Υψηλή
Δείκτης γλουτένης	Καλός
Δείκτης κίτρινου χρώματος	Υψηλός

Προτεινόμενη πυκνότητα σποράς: 22 Kg / δεκ.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στάχυ	Με μαύρα άγανα
Κόκκος	Κεχρμπαρένιος

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΟΥ

Παράστημα	Επίμηκες
Ύψος φυτού	Μεσαίο
Πρωιμότητα	Πρώιμη

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ

	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πλάγιασμα	Ικανοποιητική
Κρύο	Μικρή ευπάθεια
Υψηλές θερμοκρασίες	Ικανοποιητική
Οίδιο	Ικανοποιητική
Μαύρη Σκωρίαση	Μεσαία
Σεπτόρια	Μεσαία

- Το no. 1 στην Ελλάδα! ■ Εξαιρετική προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές συνθήκες
- Πρώιμος κύκλος ■ Υψηλή και σταθερή παραγωγή ■ Εποχή σποράς: Φθινόπωρο



Σιτάρι Σκληρό (συνέχεια)



ΑΝΑΡΟ

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εκατολιτρικό βάρος (kg/hl)	Καλό, 83-84
----------------------------	-------------

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στάχυ	Με άγανα
Κόκκος	Σκούρος κόκκινος

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΟΥ

Αδέλφωμα	Εξαιρετικό
Παράστημα	Επίμηκες
Ύψος φυτού	Μεσαίο - Υψηλό
Πρωιμότητα	Πρώιμη

Προτεινόμενη πυκνότητα σποράς: 22 Kg / δεκ.

Η υψηλή αντοχή στη ξηρασία και στις υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με την πρωιμότητα, καθιστούν την ΑΝΑΡΟ την καλύτερη επιλογή. Πολύ υψηλή αντοχή στο πλάγιασμα και στις μυκητολογικές ασθένειες και αρκετά καλή συμπεριφορά σε χαμηλές θερμοκρασίες. Στις πενταετείς συγκριτικές δοκιμές ποικιλιών, η ΑΝΑΡΟ έχει καταφέρει να καταγράψει μια απόδοση καλύτερη του μέσου όρου των μαρτύρων σε όλες τις χρονιές. Η αλεστική ποιότητα του σπόρου είναι άριστη, με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Είναι εξαιρετική τόσο για σανοποίηση όσο και για θερισμό. Κατάλληλη και για βιολογικές καλλιέργειες.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ

	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πλάγιασμα	Ικανοποιητική
Κρύο	Ικανοποιητική
Υψηλές θερμοκρασίες	Ικανοποιητική
Οίδιο	Ικανοποιητική
Μαύρη Σκωρίαση	Ικανοποιητική
Σεπτόρια	Μεσαία

- Ταξινόμηση ISQ: Αρτοποιήσιμο
- Δείκτες αλευρογραφήματος: W: 220-240



ΑΝΦΟΡΕΤΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εκατολιτρικό βάρος (kg/hl)	80-82
Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες	13-16%
Δείκτης γλουτένης	35-38
Βάρος 1000 κόκκων (g)	45-48

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στάχυ	Με άγανα
Κόκκος	Κόκκινος

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΟΥ

Ύψος φυτού	100-110 cm
Πρωιμότητα	Μεσοπρώιμη

Προτεινόμενη πυκνότητα σποράς: 22 Kg / δεκ.

Η ιδιαίτερη ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα της ΑΝΦΟΡΕΤΑ επιτρέπει στην ποικιλία να εκφράζει με συνέπεια την υψηλή παραγωγική της ικανότητα σε διάφορες κλιματολογικές συνθήκες. Ειδικότερα η μεγάλη βλαστική ικανότητα η οποία εκφράζεται από την μεγάλη φυτική μάζα στις λιγότερο παραγωγικές περιοχές και στις λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες καλλιέργειας, εξασφαλίζει την καλή ανάπτυξη των φυτών με την οποία συνδέεται η παραγωγικότητα.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ

	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πλάγιασμα	Ανθεκτική
Οίδιο	Ικανοποιητική
Μαύρη Σκωρίαση	Μεσαία
Σεπτόρια	Μεσαία

- Δείκτες αλευρογραφήματος: 200-240
- Σκληρότητα: Ημίσκληρη



ΑΡΓΟΝΕ

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εκατολιτρικό βάρος (kg/hl)	Υψηλό
Βάρος 1000 κόκκων (g)	36-40

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στάχυ	Χωρίς άγανα
Κόκκος	Λευκοκίτρινος

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΟΥ

Αδέλφωμα	Πολύ καλό
Ύψος φυτού	Μεσαίο - Υψηλό
Πρωιμότητα	Πρώιμη

Προτεινόμενη πυκνότητα σποράς: 22 Kg / δεκ.

- Παραγωγή μεγάλης βιομάζας
- Κατάταξη ISQ: Biscottiero
- Προσαρμοσμένη στο μεσογειακό περιβάλλον
- Το γεγονός ότι είναι χωρίς άγανα, την καθιστά ιδανική ποικιλία για ζωοτροφή

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ

	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πλάγιασμα	Καλή
Κρύο	Καλή
Οίδιο	Καλή
Φουζαρίωση	Μεσαία



Κριθάρι



NURE

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος	Δίστιχο (2 στίχοι)
-------	--------------------

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΟΥ

Παράστημα	Καμπυλωτό
Ύψος φυτού	Μεσαίο
Πρωιμότητα	Μεσοπρώιμη

Προτεινόμενη πυκνότητα σποράς: 17-18 Kg / δεκ.

Παρέχει εξαιρετικές αποδόσεις σε σπόρο, ξεχωρίζει για την προσαρμοστικότητα του σε κάθε καλλιεργητικό περιβάλλον και αναδεικνύεται πάντα ως μια από τις πιο παραγωγικές δίστιχες ποικιλίες. Τα εμπορικά χαρακτηριστικά του σπόρου είναι καλά λόγω του εκατολιτρικού βάρους και του βάρους ανά 1000 σπόρους, τα οποία αμφότερα παρουσιάζουν υψηλές τιμές. Το NURE είναι ένα κριθάρι με μικρή ευπάθεια στις προσβολές από το ιώδιο και από άλλες, τυπικές για το είδος, ασθένειες.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ

	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πλάγιασμα	Ικανοποιητική
Κρύο	Μικρή ευπάθεια
Οίδιο	Μικρή ευπάθεια
Ιός του κίτρινου μωσαϊκού	Ικανοποιητική

- Εποχή σποράς: Φθινόπωρο - Χειμώνας



ZHANA

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εκατολιτρικό βάρος (kg/hl)	65-69 g
Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες	Μεσαία
Βάρος 1000 κόκκων (g)	47-52

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος	Δίστιχο (2 στίχοι)
-------	--------------------

Προτεινόμενη πυκνότητα σποράς: 17-18 Kg / δεκ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΟΥ

Αδέλφωμα	Πολύ καλό
Ύψος φυτού	Μεσαίο

- Παραγωγικό, πρώιμο ανοιξιτικό κριθάρι
- Ανθεκτικό στις ασθένειες, με καλό μέγεθος καρπού
- Ποικιλία προσαρμοσμένη σε φτωχό έδαφος και θερμά κλίματα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ

	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πλάγιασμα	Ανθεκτική
Κρύο	Ανθεκτική
Οίδιο	Πολύ καλή
Ελμινθοσπορίωση	Μέτρια



ALASTRO

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εκατολιτρικό βάρος (kg/hl)	Μεσαίο
Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες	Καλή
Βάρος 1000 κόκκων (g)	48-54

Προτεινόμενη πυκνότητα σποράς: 17-18 Kg / δεκ.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος	Δίστιχο (2 στίχοι)
-------	--------------------

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΟΥ

Αδέλφωμα	Πολύ καλό
Ύψος φυτού	Μεσαίο - Υψηλό
Πρωιμότητα	Μεσοπρώιμη

- Υψηλό δυναμικό παραγωγής
- Μεγάλη παραγωγή βιομάζας

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ

	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πλάγιασμα	Ανθεκτική
Κρύο	Αρκετά Ανθεκτική
Οίδιο	Ανθεκτική
Ελμινθοσπορίωση	Μέτρια Ανθεκτική



Τριτικάλε



TALAVERA

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εκατολιτρικό βάρος (kg/hl)	Υψηλό
Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες	10-12%
Βάρος 1000 κόκκων (g)	Υψηλό

Προτεινόμενη πυκνότητα σποράς: 22-25 Kg / δεκ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΟΥ

Ύψος φυτού	Υψηλό (120-140 cm)
Πρωιμότητα	Μεσοπρώιμη

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ

	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πλάγιασμα	Ανθεκτική
Οίδιο	Υψηλή
Μαύρη Σκωρίαση	Μεσαία - Υψηλή
Σεπτορίωση	Ανθεκτική



Τριτικάλε (συνέχεια)



ALKMINI

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εκατολιτρικό βάρος (kg/hl)	76,0 ± 2
Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες	NX57,135 ± 0,5
Βάρος 1000 κόκκων (g)	43 ± 2g

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στάχυ	Μακρύ (12 ± 2 cm), Μέτριο συμπαγές
-------	------------------------------------

Γενεαλογία: *Triticalex Triticosecale Wittmack*

Προτεινόμενη πυκνότητα σποράς: 22-25 Kg / δεκ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΟΥ

Αδέλφωμα	Πλούσιο
Ύψος φυτού	Μέτριο (95 ± 5 cm)
Πρωιμότητα	Πρώιμη

Αγανοφόρος ποικιλία, με δυνατό καλάμι, μεσοπρώιμη, ανθεκτική στο πλάγιασμα και τις ασθένειες, ανθεκτική στο ψύχος αλλά και στην ξηρασία, με μεγάλα στάχυα (12 cm), με πολύ υψηλές και σταθερές αποδόσεις. Σπόρος μεγάλος, γεμίζει καλά κάτω από ευνοϊκές συνθήκες. Είναι κατάλληλη για αρτοποιήση και πολύ καλή ως ζωστροφή.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ

	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πλάγιασμα	Ανθεκτική
Κρύο	Ανθεκτική
Ξηρασία	Ανθεκτική
Ασθένειες	Ανθεκτική

- Απόδοση: Πολύ υψηλή (+15% των μαρτύρων)
- Σταθερότητα Απόδοσης: Πολύ καλή
- Προσαρμοστικότητα: Ειδική στα φτωχά και όξινα εδάφη



Βρώμη



ΠΗΓΑΣΟΣ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στάχυ	Με καιρό άγανα
-------	----------------

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΟΥ

Αδέλφωμα	Πλούσιο
Ύψος φυτού	100 cm ± 5 cm
Πρωιμότητα	Μεσοπρώιμη

Προτεινόμενη πυκνότητα σποράς: 17-20 Kg / δεκ.

- Φυτό με πλούσιο αδέλφωμα.
- Αντοχή στις κυριότερες ασθένειες
- Παραγωγική ποικιλία σε σανό και καρπό
- Καλλιέργεια σε όλα τα είδη εδάφους

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ

	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πλάγιασμα	Καλή
Κρύο	Πολύ καλή
Οίδιο	Πολύ καλή
Σεπτωρίωση	Καλή
Φουζαρίωση	Καλή



Λόλιο Κτηνοτροφικό



HELLEN

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες	10-20%
-----------------------------	--------

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΟΥ

Ύψος φυτού	100-120 cm (άνθιση)
------------	---------------------

Προτεινόμενη πυκνότητα σποράς: 10 Kg / δεκ.

- Κτηνοτροφικό Lolium (Λόλιο)
- Πλούσιο φύλλωμα
- 3-6 κοπές/χρόνο (αναλόγως καιρικών συνθηκών, ποσότητας/ποιότητας νερού, βασικής/επιφανειακής λίπανσης)
- Παραγωγή 8-10 τόνων χορτομάζας ανά δεκάριο

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ

	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Φουζάριο	Μεγάλη
Βακτήριο	Μεγάλη
Σκωρίαση	Μεγάλη



VESPOLINI

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΟΥ

Πρωιμότητα	Μεσοπρώιμη
------------	------------

Κτηνοτροφική ποικιλία λόλιου (Lolium) με υψηλή απόδοση σε ξηρά ουσία.

Προτεινόμενη πυκνότητα σποράς: 10 Kg / δεκ.

- Κορυφαία απόδοση 1 ή 2 κοπών: Από την πρώτη κοπή επιτυγχάνεται πολύ υψηλή απόδοση. Η συνολική απόδοση από την 1η + 2η κοπή είναι στο υψηλότερο επίπεδο
- Τετραπλοειδής: Η Vespolini είναι τετραπλοειδής, συνώνυμη των υψηλών αποδόσεων ξηρής ουσίας και γευστικότητας καθώς επίσης της αυξημένης αντοχής στη σκωρίαση αλλά και γενικά της ανοχής στην καταπόνηση
- Κορυφαία ποιότητα: Οι παραφυάδες και τα φύλλα της θεωρούνται υψηλής ποιότητας τροφή ανάμεσα στα χόρτα της εύκρατης ζώνης

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ

	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πλάγιασμα	Ανθεκτική
Κρύο	Ανθεκτική
Οίδιο	Πολύ καλή
Ελμινθοσπορίωση	Μέτρια

- Εξασφαλίζει εξαιρετική ποιότητα διατροφής κατά τη βόσκηση
- Γρήγορη εγκατάσταση: Η Vespolini εγκαθίσταται πολύ γρήγορα, μειώνοντας τον χρόνο από τη σπορά έως την πρώτη κοπή



Βίκος



MARIANNA

Ποικιλία βίκου πολύ ανθεκτική που προσαρμόζεται σε συνθήκες δύσκολες (ζέστη – ξηρασία). Εφοδιασμένη με άριστη αντοχή στο κρύο και σε συγκεκριμένες ασθένειες. Αποδίδει καλά σε συγκαλλιέργεια με τη Βρώμη για την παραγωγή σανού και με το κτηνοτροφικό κουκί για την παραγωγή σπόρου. Κατάλληλη για όλα τα εδάφη και όλες τις περιοχές.

Προτεινόμενη πυκνότητα σποράς: 15 Kg / δεκ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΟΥ

Πρωιμότητα	Πρώιμη
------------	--------

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ

	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πλάγιασμα	Ανθεκτική
Κρύο	Μικρή ευπάθεια
Ασθένειες	Ανεκτική

- Παραγωγή σε σανό: 600-700 Kg/δεκ. (ξηρά ουσία)
- Παραγωγή σε σπόρο: 230-280 Kg/δεκ.



ALEXANDROS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΟΥ

Ύψος φυτού	Μεσαίο
Πρωιμότητα	Μεσοπρώιμη

Προτεινόμενη πυκνότητα σποράς: 15 Kg / δεκ.

- Φυτό μέσης πρωιμότητας, πολύ παραγωγικό
- Αντοχή στις κυριότερες ασθένειες
- Μεγάλη απόδοση σε καρπό και σανό

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ

	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πλάγιασμα	Πολύ καλή
Κρύο	Καλή
Οίδιο	Καλή
Φουζαρίωση	Καλή



IDICE

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΟΥ

Ύψος φυτού	Μεσαίο
Πρωιμότητα	Πρώιμη

Προτεινόμενη πυκνότητα σποράς: 10 Kg / δεκ.

- Πρώιμη ποικιλία υψηλής παραγωγής
- Αντοχή στις αρρώστιες
- Εύρωστο φυτό με πλούσιο φύλλωμα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ

	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πλάγιασμα	Καλή
Κρύο	Καλή
Οίδιο	Μέτρια - Καλή
Φουζαρίωση	Καλή



Μπιζέλι κτηνοτροφικό



DODONI

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΟΥ

Αδέλφωμα	Πλούσιο
Ύψος φυτού	105 ± 10 cm

Προτεινόμενη πυκνότητα σποράς: 14-15 Kg / δεκ.

- Σπορά: αρχές και μέσα φθινοπώρου
- Χρώμα Άνθους: Μωβ
- Χρώμα Σπόρου: Υποπράσινο
- Παραγωγικό σε σανό και καρπό

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ

	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πλάγιασμα	Ανθεκτική
Κρύο	Ανθεκτική
Οίδιο	Ανθεκτική
Καστανή Σκωρίαση	Ανθεκτική
Σεπτορίωση	Ανθεκτική
Φουζαρίωση	Καλή



Κουκί κτηνοτροφικό



VESUVIO

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΟΥ

Ύψος φυτού	Υψηλό
Πρωιμότητα	Μεσοπρώιμο

Προτεινόμενη πυκνότητα σποράς: 14-15 Kg / δεκ.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φθινοπωρινή σπορά για παραγωγή καρπού ή σανού για τη διατροφή των ζώων. Πολύ καλό στην ενσίρωση, ειδικά με κάποιο αγρωστώδες (π.χ. βρώμη, κριθάρι). Μεγάλη απόδοση σε βιομάζα με πλούσιο ριζικό σύστημα.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ

	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πλάγιασμα	Πολύ καλή
Κρύο	Μέτρια
Οίδιο	Καλή



Τριφύλλι πολυετές



BLUE ACE

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 28-29%

- Κορυφαία παραγωγή - Άριστη ποιότητα!!!
- Ποικιλία μικρής διάρκειας ληθάργου (κατηγορία ληθάργου group 9)
- Εξαιρετική φυτρωτική ικανότητα
- Ανοιχτού τύπου κεφαλής με μεγάλο αριθμό στελεχών (9-11 στελέχη / κεφαλή)

Προτεινόμενη πυκνότητα σποράς: 6-8 Kg / δεκ.

- Φυτό όρθιας ανάπτυξης με υψηλό ποσοστό φύλλων ανά στέλεχος
- Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες (28-29% επί ξηράς ουσίας)
- Υψηλή πεπτικότητα (68-72% επί ξηράς ουσίας)
- Ανθεκτικότητα σε ασθένειες και έντομα που εξασφαλίζουν υγιή και ζωηρά φυτά

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

HR
Αφίδα της μηδικής (<i>Therioaphis maculata</i>)
Μπλε αφίδα (<i>Acyrtosiphon kondoi</i>)
IR
Φουζάριο (<i>Fusarium sp.</i>)
Φυτόφθορα (<i>Phytophthora sp.</i>)
Ανθράκνωση (<i>Anthracoise sp.</i>)
Αφίδα των μπιζελιών (<i>Acyrtosiphon pisum</i>)



GEA

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 12-25%

Παραγωγή χορτομάζας: 3.5 - 4 τόνους ανά δεκάριο επί ξηρού (6 - 7 κοπές το χρόνο)
Κατηγορία ληθάργου: Group 7

Προτεινόμενη πυκνότητα σποράς: 6-8 Kg / δεκ.

Μεσογειακή ποικιλία πολυετούς τριφυλλίου με ομοιογενή ποιότητα σπόρου. Πολύ καλή αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες. Άριστη ποιότητας φύλλωμα με σωστή αναλογία φυλλώματος / στελέχους. Συστήνεται τόσο για χλωρή κατανάλωση όσο και για σανοποίηση. Ιδανική για συχνά κοψίματα. Η μέγιστη παραγωγή πρωτεΐνης είναι στην άνθιση του φυτού ενώ το ποσοστό πρωτεΐνης που περιέχει είναι 12% έως 25% επί ξηρού αναλόγως με το κόψιμο.

Πρώτο κόψιμο: περίπου 70 - 75 μέρες μετά τη σπορά.



LUXOR

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 26-29%

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΟΥ

Ύψος φυτού	Μεσαίο
Πρωιμότητα	Πρώιμη

Εξαιρετικός συνδυασμός υψηλού παραγωγικού δυναμικού και άριστης ποιότητας.

Προτεινόμενη πυκνότητα σποράς: 6-8 Kg / δεκ.

- Ποικιλία μικρής διάρκειας ληθάργου (Group 9)
- Εξαιρετική φυτρωτική ικανότητα
- Φυτό όρθιας ανάπτυξης με υψηλό ποσοστό φύλλων ανά στέλεχος
- Ανοιχτός τύπος κεφαλής και μεγάλος αριθμός στελεχών ανά κεφαλή
- Εξαιρετική ανθεκτικότητα σε ασθένειες και εντομολογικές προσβολές που εξασφαλίζουν υγιή και ζωηρά φυτά
- Υψηλή περιεκτικότητα πρωτεΐνων (26-29% επί ξηράς ουσίας) και πεπτικότητας (68-72%)

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

HR
Αφίδα της μηδικής (<i>Therioaphis maculata</i>)
Μπλε αφίδα (<i>Acyrtosiphon kondoi</i>)
IR
Φουζάριο (<i>Fusarium sp.</i>)
Φυτόφθορα (<i>Phytophthora sp.</i>)
Ανθράκνωση (<i>Anthracoise sp.</i>)
Αφίδα των μπιζελιών (<i>Acyrtosiphon pisum</i>)



Eragrostis tef



TEFF

NEO

Παραδοσιακός σπόρος της κεντρικής Αφρικής, ο οποίος καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά στην Αιθιοπία πριν από 4.000 χρόνια. Οι σπόροι είναι από τους μικρότερους όλων των σπόρων δημητριακών, συνήθως με μέγεθος μικρότερο από 1 χιλιοστό, παρόμοιο με τον παπαρουνόσπορο. Είναι μια ευκολοπροσάρμοστη καλλιέργεια, ανέχεται καλά την ξηρασία και τα υγρά εδάφη. Η χορτομάζα του TEFF, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βόσκηση, ως σανός ή ενσίρωμα.

Προτεινόμενη πυκνότητα σποράς: 2-2.5 Kg / δεκ.

Εκτιμάται ιδιαίτερα για την γευστικότητα, την υψηλή θρεπτική αξία και την υψηλή απόδοση. Η καλλιέργεια ξεχωρίζει για την ταχεία ανάπτυξη, την αντοχή στην ξηρασία και την ικανότητά της να πνίγει τα ζιζάνια.

- Πολλαπλής κοπής
- Ύψος μεταξύ 70-100 cm
- Ανθεκτικό σε συνθήκες ξηρασίας
- Εξαιρετικός ρυθμός ανάπτυξης
- Ισχυρή ικανότητα να ανταγωνίζεται τα ζιζάνια
- Εξαιρετική παραγωγικότητα χορτονομής
- Υψηλής ποιότητας ζωοτροφές τόσο σε θρεπτική αξία όσο και σε γευστικότητα

- **Ωρίμανση:** Έχει πολύ μικρό βιολογικό κύκλο (100-110 ημέρες)
- **Χρόνος σποράς:** Μέσα Απριλίου/μέσα Μαΐου όταν η θερμοκρασία εδάφους είναι πάνω από 16°C
- **Πυκνότητα φύτευσης:** Σε σειρές με όχι μεγαλύτερη απόσταση από 10 cm και βάθος σποράς 0.2-0.5 cm
- **Συγκομιδή:** Η πρώτη κοπή πρέπει να γίνεται στα 10 cm για να ενθαρρύνεται η ταχεία αναγέννηση
- **Διάστημα μεταξύ σποράς και πρώτης κοπής:** Περίπου 50 ημέρες, ενώ για τις επόμενες 30-35 μέρες



Πεννιζέτο (Pennisetum glaucum)



OKASHANA

Είναι μια καλοκαιρινή-ετήσια κτηνοτροφική καλλιέργεια υψηλής θρεπτικής αξίας, δημοφιλής στους κτηνοτρόφους για βόσκηση, ενσίρωση, σανό και χλωρή κοπή. Είναι ίσως το πιο ανθεκτικό στην ξηρασία από τις καλλιέργειες καλοκαιρινών σιτηρών.

Προτεινόμενη πυκνότητα σποράς: 5-7 Kg / δεκ.

Προτιμά τα καλά στραγγιζόμενα εδάφη και στο στάδιο του σπορόφυτου μοιάζει πολύ με φυτό καλαμποκιού ή σόργου.

- **Κοπές:** 1-2 (εάν είναι ευνοϊκές οι συνθήκες μπορεί να δώσει μέχρι 2 κοψίματα (1ο κόψιμο 15-20cm))
- **Ύψος καλλιέργειας:** 1.3 – 1.9m
- **Ανοχή στην ξηρασία:** Καλή

- **Ανεκτικότητα στον περονόσπορο, τον άνθρακα και την εργοτίαση:** Πολύ ανεκτική
- **Καταλληλότητα για άλογα:** Δεν περιέχει οξέα ή τανίνες, όπως ο σόργος, γεγονός που την κάνει κατάλληλη για άλογα
- **Ωρίμανση:** Ποικιλία πρώιμης ωρίμανσης 85 – 90 ημερών
- **Απόδοση:** Έως 190Kg/δεκ



Σόργος (Sorghum bicolor X sudanense)



BOVITAL

Καλοκαιρινό κτηνοτροφικό φυτό, που αναπτύσσεται γρήγορα. Έχει υψηλή παραγωγή χλωρής και ξηρής χορτομάζας με υψηλή θρεπτική αξία. Είναι κατάλληλο για βόσκηση, χλωρή κοπή, σανό και ενσίρωση. Κατάλληλη για όλους τους τύπους εδάφους, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών με άργιλο και φτωχών εδαφών. Με καλά ανεπτυγμένο ριζικό σύστημα που της επιτρέπει να έχει πρόσβαση στα θρεπτικά συστατικά που υπάρχουν σε διάφορα μέρη του εδάφους.

Προτεινόμενη πυκνότητα σποράς: 8-10 Kg / δεκ.

- **Κοπές:** Πολλαπλής κοπής
- **Ύψος:** Μέχρι 2-2.5 m
- **Αντοχή σε ασθένειες:** Υψηλή
- **Ανοχή στην ξηρασία:** Υψηλή
- **Θρεπτική αξία:** Υψηλή
- **Βάθος σποράς:** 1.2-2.0 cm
- **Περίοδος σποράς:** από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο όταν η θερμοκρασία του εδάφους είναι τουλάχιστον 16 °C
- **Λίπανση:** Εφαρμόστε κατά την περίοδο πριν την σπορά 4-6 Kg/δεκ. μονάδων φωσφόρου και 8-10 Kg/δεκ. μονάδων αζώτου κατά τη σπορά



Κεχρί (*Setaria italica*)



ΜΟΗΑ

Ανάπτυξη ανάλογη με αυτήν του σόργου με τη διαφορά ότι μερικές φορές η παραγωγή στελεχών (αδέλφωμα) είναι πιο άφθονη. Ο χρόνος του βλαστικού της κύκλου είναι σύντομος από 2 έως 3 μήνες.

Όλα τα είδη κεχριού ανέχονται καλά τις υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρασία. Η καλλιέργεια του ελάχιστα διαφέρει από την καλλιέργεια άλλων σιτηρών. Γενικά είναι φυτό χωρίς πολλές απαιτήσεις, είναι ανθεκτικό έναντι των ζιζανίων και προσβάλλεται σπάνια από ασθένειες.

Προτεινόμενη πυκνότητα σποράς: 5-7 Kg / δεκ.

- **Κοπές:** Ποικιλία μιας κοπής
- **Ύψος:** 70-90 cm
- **Καλλιεργητικός κύκλος:** Πολύ μικρός (50-60 ημέρες)
- **Χρήση:** Κατάλληλο για χλωρά τροφή η σανοποίηση
- **Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη:** κατά μέσο όρο 7.6%
- **Δόση σποράς:** 3-4 Kg/δεκ.
- **Βάθος σποράς:** 0.6-1.2 εκ.
- **Χρόνος βλάστησης:** 5-7 ημέρες
- **Περίοδος σποράς:** Από Απρίλη μέχρι Ιούλιο

Φυτό που απαιτεί άρδευση για μεγιστοποίηση της παραγωγής.



Καλαμπόκι κτηνοτροφικό



EGEAN

Η κτηνοτροφική ποικιλία EGEAN ξεχωρίζει για την υψηλή προσαρμοστικότητα της σε όλους τους τύπους εδάφους. Ο συνδυασμός της υψηλής θρεπτικής αξίας ενσώματου με τους γεμάτους σπάδικες μέχρι την άκρη, καθιστούν την ποικιλία αυτή αξιόπιστο σύμμαχο για τον κάθε κτηνοτρόφο.

Προτεινόμενη πυκνότητα σποράς: 7-8 Kg / δεκ. (6,000 - 8,000 φυτά / δεκ.)

- **Ορίμανση:** 128-133 ημέρες
- **Ύψος:** Μέχρι 4.2 m
- **Παραγωγή:** Υψηλή παραγωγή υπέργειας βιομάζας
- **Θρεπτική αξία ενσώματου:** Πολύ υψηλή
- **Σπάδικες:** 26-28cm με 14-16 σειρές, γεμάτοι μέχρι την άκρη
- **Καρπός:** Κόκκινο χρώμα οδοντωτού τύπου





Η ιστορία της YARA ξεκινάει από πολύ παλιά, το 1905. Για περισσότερα από 100 χρόνια ασχολείται με την θρέψη των φυτών και την παραγωγή λιπασμάτων.

Σήμερα, η έδρα της είναι το Όσλο της Νορβηγίας ενώ ταυτόχρονα έχει μια παγκόσμια παρουσία με περισσότερους από 16.000 υπαλλήλους και λειτουργεί σε περισσότερες από 60 χώρες.

Η αποστολή της Yara είναι ταυτόχρονα απλή αλλά και πολύ φιλόδοξη:
Με υπευθυνότητα να θρέψει τον πληθυσμό της γης και να προστατέψει τον πλανήτη.

Οι λύσεις της αναφορικά με την θρέψη των φυτών και σε συνδυασμό με τις προτάσεις ακριβείας πάνω στο αντικείμενο της γεωργίας επιτρέπουν στους αγρότες να αυξήσουν την απόδοση και την ποιότητα των καλλιεργειών τους, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι περιβαλλοντικές και βιομηχανικές λύσεις που προσφέρει βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε και μειώνουν τις εκπομπές αερίων.





Λιπάσματα Βασικής Λίπανσης



STAR PLUS 21-17-3 + 0,15 Zn

Ολικό Άζωτο.....	21%
Αμμωνιακό.....	13.5%
Νιτρικό.....	7.5%
Φωσφόρος.....	17%
Κάλιο.....	3%
Θείο.....	4%
Ψευδάργυρος.....	0.15%



BASIC 25-10-0

Ολικό Άζωτο.....	25%
Αμμωνιακό.....	14%
Νιτρικό.....	11%
Φωσφόρος.....	10%
Θείο.....	6%



SUPERSEMINA 18-20-0

Ολικό Άζωτο.....	18%
Αμμωνιακό.....	12.5%
Νιτρικό.....	5.5%
Φωσφόρος.....	20%
Σίδηρος.....	0.02%
Ψευδάργυρος.....	0.002%
Ασβέστιο.....	4%
Θείο.....	14%



NP 20-10-0

Ολικό Άζωτο.....	20%
Αμμωνιακό.....	12%
Νιτρικό.....	8%
Φωσφόρος.....	10%
Θείο.....	14%

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΡΙΟ

20-25 Kg*

20-25 Kg*

30-35 Kg*

30-35 Kg*

Διακόπτης ροής για Big Bags

Ο διακόπτης ροής είναι ένας πολύτιμος βοηθός για τον γεωργοκτηνοτρόφο που χρησιμοποιεί big bags αφού με το εργαλείο αυτό, μπορεί να γεμίζει τον σπορέα του με λίπασμα ή/και σπόρο από το big bag χωρίς να χρειάζεται επιπλέον χέρια.

EQUIP031



Λιπάσματα Επιφανειακής Λίπανσης



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ (ΧΩΝΙ)



YaraVera AMIDAS

Ολικό Άζωτο.....	40%
Ουρικό.....	35%
Αμμωνιακό.....	5%
Θείο.....	14%



YaraBela EXTRAN 33.5

Ολικό Άζωτο.....	33.5%
Αμμωνιακό.....	16.9%
Νιτρικό.....	16.9%



UBESOL 45

Ολικό Άζωτο.....	21%
Αμμωνιακό.....	21%
Θείο.....	24%



OYPIA 46-0-0

Ολικό Άζωτο.....	46%
Ουρικό.....	46%

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΡΙΟ

8-10 Kg*

10-12 Kg*

18-22 Kg*

10-12 Kg*

* Η δόση του λιπάσματος που αναγράφεται είναι η προτεινόμενη από την εταιρεία. Η δόση δύναται να αλλάξει ανάλογα με το είδος του εδάφους, το είδος και το στάδιο της καλλιέργειας, τις κλιματολογικές συνθήκες και άλλους αστάθμητους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν.



Διαφυλλικά Λιπάσματα



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ



Plant Prod 35-5-10 + IXN

Ολικό Άζωτο.....	35%
Νιτρικό.....	2.1%
Ουρικό.....	32.9%
Φωσφόρος.....	5%
Κάλιο.....	10%
+ Ιχνοστοιχεία	



Plant Prod 28-14-14 + IXN

Ολικό Άζωτο.....	28%
Αμμωνιακό.....	0.3%
Νιτρικό.....	1.7%
Ουρικό.....	26%
Φωσφόρος.....	14%
Κάλιο.....	14%
+ Ιχνοστοιχεία	



Δείτε την ποιότητα στην διαλυτότητα του λιπάσματος Plant Prod.



Soluplant 30-10-10 + IXN

Ολικό Άζωτο.....	30%
Αμμωνιακό.....	2.2%
Νιτρικό.....	3%
Ουρικό.....	24.8%
Φωσφόρος.....	10%
Κάλιο.....	10%
+ Ιχνοστοιχεία	

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΡΙΟ

150-200 g*

150-200 g*

150-200 g*



DELTA SPRAY 30-10-10 + IXN

Ολικό Άζωτο.....	30%
Αμμωνιακό.....	2%
Νιτρικό.....	3%
Ουρικό.....	25%
Φωσφόρος.....	10%
Κάλιο.....	10%
+ Ιχνοστοιχεία	



SAFE-N 300

Υγρό Άζωτο.....	31.2%
(συσκευασία 10L)	



Black Earth Fulvic

Υγρό συμπύκνωμα Φουλβικών Οξέων



Microcat Cereal Start

Ελεύθερα Αμινοξέα.....	4.8%
Πολυσακχαρίτες.....	14.5%
Ολικό Άζωτο (N).....	4.8%
Πεντοξειδίο του Φωσφόρου (P ₂ O ₅).....	7.2%
Οξειδίο του Καλίου (K ₂ O) υδατοδιαλυτό.....	7.2%
Σίδηρος (FE) EDTA.....	0.5%

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΡΙΟ

150-200 g*

1.1-2.2 L*

2-3 L*

100-150 ml*

* Η δόση του λιπάσματος που αναγράφεται είναι η προτεινόμενη από την εταιρεία. Η δόση δύναται να αλλάξει ανάλογα με το είδος του εδάφους, το είδος και το στάδιο της καλλιέργειας, τις κλιματολογικές συνθήκες και άλλους αστάθμητους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν.

Ζιζανιοκτόνα

DESORMONE 60SL



Μεταφυτρωτικό, διασυστηματικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων.

☛ Καλλιέργειες:

- ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ ■ ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ
- ΚΡΙΘΑΡΙ ■ ΣΙΚΑΛΗ ■ ΒΡΩΜΗ

● Δόση ανά δεκάριο: 80 - 125 ml

CIRRA 34.5 SL



Μεταφυτρωτικό, διασυστηματικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος για την αντιμετώπιση πλατύφυλλων ζιζανίων σε Σιτηρά και τριφύλλι.

☛ Καλλιέργειες:

- ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ ■ ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ ■ ΚΡΙΘΑΡΙ
- ΣΙΚΑΛΗ ■ ΤΡΙΦΥΛΛΙ

● Δόση ανά δεκάριο: 75 - 150 ml (για σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη)

FLOPPER 306SE



Διασυστηματικό και μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι, κριθάρι και αραβόσιτο.

☛ Καλλιέργειες:

- ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ ■ ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ
- ΚΡΙΘΑΡΙ ■ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

● Δόση ανά δεκάριο: 60 - 80 ml

SENIOR 75WG



Εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι.

☛ Καλλιέργειες:

- ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ ■ ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ

● Δόση ανά δεκάριο: 20 - 25 ml

☛ Καταπολεμεί:

■ **Ετήσια πλατύφυλλα** (αγριομελιτζάνα, άγριο σινάπι, αλμυρίδι, ασπράγκαθο, βλήτα, ήμερο σινάπι, ζωχός, θάσπι, καφέλλα, λουβουδιά, σισύμπριο, τάτουλας, ρανούγκουλος, ραπανίδα)

■ **Πολυετή πλατύφυλλα** (κίρσιο, λάπαθα, περιπλοκάδα)

Δραστική Ουσία: 2,4-D οξύ: 60% β/ο (υπό μορφή άλατος διμεθυλαμίνης: 72,24 % β/ο)

Χρόνος Εφαρμογής: Από το στάδιο του αδελφώματος της καλλιέργειας έως το στάδιο που ο πρώτος κόμβος βρίσκεται σε ύψος 1 εκ. πάνω από τον κόμβο του αδελφώματος (BBCH 29 - 31)

☛ Καταπολεμεί:

Αγριόβικο (*Vicia sativa*), Κίρσιο (*Cirsium arvense*), Παπαρούνα (*Papaver rhoeas*), Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis*) και Ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*).

Δραστική Ουσία: 2,4-D οξύ: 34,5% β/ο (υπό μορφή άλατος DMA: 41,54 % β/ο)

MCPA: 34,5% β/ο (υπό μορφή άλατος DMA: 42,26 % β/ο)

Χρόνος Εφαρμογής: Σιτηρά: Από το τέλος του αδελφώματος μέχρι και την εμφάνιση του φύλλου «σημαίας» (BBCH 29-36).

☛ Καταπολεμεί:

Κολλητσίδα (αρκοπογιά ή αρκοβαφή) (*Gallium spurium*, *G. aparine*), παπαρούνα (*Papaver rhoeas*), στελλάρια (*Stellaria media*), άγριο σινάπι (λαψάνα) (*Sinapis arvensis*), καψέλα (*Capsella bursa-pastoris*), χαμομήλι (*Matricaria chamomilla*), ανθεμίδα (*Anthemis arvensis*), ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*), άδωνης (*Adonis aestivalis*), μπιφόρα (*Bifora radians*).

Δραστική Ουσία: florasulam: 0,625% β/ο

2,4-D (σε μορφή 2-EHE): 45,25% β/ο (30% β/ο 2,4-D ισοδύναμο οξύ)

Χρόνος Εφαρμογής: Μία και μόνο μεταφυτρωτική εφαρμογή κατά την περίοδο του αδελφώματος των σιτηρών έως τον πρώτο κόμβο και όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4-6 φύλλων.

☛ Καταπολεμεί:

■ **Ευαίσθητα αγρωστώδη** (αγριοβρώμη (αγριοσιφούναρο) (*Avena spp.*), αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides*), βρώμος (μαχαιράς) (*Bromus spp.*), ήρα (*Lolium spp.*)

■ **Μετρίως ευαίσθητα αγρωστώδη** (φάλαρη (*Phalaris sp.*))

■ **Ευαίσθητα πλατύφυλλα** (ανθέμιδα (*Anthemis arvensis*), σινάπι (λαψάνα) (*Sinapis arvensis*))

■ **Μετρίως ευαίσθητα πλατύφυλλα** (κολλητσίδα (αρκοπογιά ή αρκοβαφή) (*Gallium aparine*), χαμομήλι (*Matricaria chamomilla*))

Δραστική Ουσία: pyroxsulam: 7,5% β/β, Cloquintocet-mexyl: 7,5%, β/β

(αντιφυτοτοξικός παράγοντας)



Ζιζανιοκτόνα

BELURE T



Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των σουλφονουριών για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε Σιτάρι (μαλακό και σκληρό), Κριθάρι και Τριτικάλε.

☛ **Καλλιέργειες:**

- ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ ■ ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ
- ΚΡΙΘΑΡΙ ■ ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ

● **Δόση ανά δεκάριο:** 2 g

☛ **Όγκος ψεκ. υγρού ανά δεκάριο:** 10-50 λίτρα

Δρα διασυστηματικά, απορροφάται κυρίως από το φύλλωμα και δευτερευόντως από τη ρίζα των ζιζανίων, μετακινείται στα ακραία μεριστώματα, βλαστού και ρίζας και εμποδίζει την ανάπτυξή τους. Δρα ως παρεμποδιστής του ενζύμου συνθετάση του οξικογαλακτικού (ALS) με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της βιοσύνθεσης των αμινοξέων.

Δραστική Ουσία: tribenuron-methyl: 75% β/β

Χρόνος Εφαρμογής: Μεταφυτρωτική εφαρμογή μετά τα 9 φύλλα της καλλιέργειας και μέχρι το τέλος του αδελφώματος

FRESNO EW



Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτάρι και κριθάρι.

☛ **Καλλιέργειες:**

- ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ ■ ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ ■ ΚΡΙΘΑΡΙ

● **Δόση ανά δεκάριο:** 100-120 ml μέγιστη

☛ **Όγκος ψεκ. υγρού ανά δεκάριο:** 20-40 λίτρα

☛ **Καταπολεμεί:**

- **Αγρωστώδη / ευαίσθητα ζιζάνια** (Σετάρια (*Setaria spp.*), Τραχεία λειβαδοπόα (*Poa trivialis*), Αλεπονουρά (*Alopecurus spp.*), Αγριοβρώμη (*Avena spp.*), Φάλαρη (*Phalaris spp.*), Ανεμόχορτο (*Apera spicaventi*)

Δραστική Ουσία: fenoxaprop-P-ethyl 6,9% β/ο

Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: Cloniquitacet-mexyl 3,45% β/ο

Χρόνος Εφαρμογής: Μεταφυτρωτική εφαρμογή από την εμφάνιση του πρώτου φύλλου μέχρι και το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου της καλλιέργειας

QUIZ 5 EC



Διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων.

☛ **Καλλιέργειες:**

- ΤΡΙΦΥΛΛΙ ■ ΜΠΙΖΕΛΙ ■ ΚΟΥΚΚΙΑ

● **Δόση ανά δεκάριο:** 100-150 ml ετήσια, 200-300 πολυετή

☛ **Καταπολεμεί:**

- **Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια** (Αλεπονουρές, Ανεμόχορτο, Βρώμη, Δακτυλίδες, Αιματόχορτο, Μουχρίτσα, Ελευσίνη, Κριθάρια, Ήρες, Φαλαρίδες, Πάνικο, Σετάριας, Βέλιουρας από σπόρο, Σιτάρια)
- **Πολυετή ζιζάνια** (Αγρόπυρο, Αγρωστis, Αγριάδα, Πάσπαλο, Βέλιουρας από ριζώματα)

Δραστική Ουσία: Quizalofop-P-ethyl: 5% β/ο

Χρόνος Εφαρμογής: Μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 2-3 φύλλων μέχρι το αδελφωμα των ζιζανίων και πριν τα ζιζάνια καλυφθούν από την καλλιέργεια.

BENI 87 SG



Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων.

☛ **Καλλιέργειες:**

- ΣΙΤΑΡΟΠΟΥΛΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ

● **Δόση ανά δεκάριο:** 100 g

Δραστική Ουσία: bentazone: 87% β/β

Χρόνος Εφαρμογής: Εφαρμόζεται νωρίς μεταφυτρωτικά, όταν η καλλιέργεια είναι στο στάδιο των 1-πραγματικών φύλλων. (BBCH 10-19)

OBELISK 97 WG



Εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε χειμερινά σιτηρά.

☛ **Καλλιέργειες:**

- ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ ■ ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ ■ ΣΙΚΑΛΗ

● **Δόση ανά δεκάριο:** 50 g με προσθήκη προσκολλητικής ουσίας

Δραστική Ουσία: mefenpyr-diethyl: 97% β/β

Χρόνος Εφαρμογής: Από την έναρξη του αδελφώματος έως το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου της καλλιέργειας (BBCH 21-32).

Εντομοκτόνα

KAISO SORBIE 5EG



Ευρέος φάσματος πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο που δρα δια επαφής και δια στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση, για την αντιμετώπιση μυζητικών καθώς και μασητικών εντόμων.

☛ Καλλιέργειες:

- ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ ■ ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ ■ ΚΡΙΘΑΡΙ
- ΣΙΚΑΛΗ ■ ΣΙΤΑΡΟΠΟΥΛΑ

● Δόση ανά δεκάριο: 15-30 g

CYPAN 50EC



Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου που δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.

☛ Καλλιέργειες:

- ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ ■ ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ ■ ΣΙΚΑΛΗ
- ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ ■ ΚΡΙΘΑΡΙ ■ ΒΡΩΜΗ ■ ΜΠΙΖΕΛΙ
- ΤΡΙΦΥΛΛΙ ■ ΣΙΤΑΡΟΠΟΥΛΑ

● Δόση ανά δεκάριο: 5 ml

RITMUS 2.5 EC



Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων.

☛ Καλλιέργειες:

- ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ ■ ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ ■ ΚΡΙΘΑΡΙ
- ΒΡΩΜΗ ■ ΣΙΚΑΛΗ ■ ΣΟΡΓΟΣ ■ ΣΙΤΑΡΟΠΟΥΛΑ

● Δόση ανά δεκάριο: 7.5 - 25 ml

METEOR



Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων.

☛ Καλλιέργειες:

- ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ ■ ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ ■ ΚΡΙΘΑΡΙ
- ΜΠΙΖΕΛΙ ■ ΚΟΥΚΙΑ ■ ΣΙΤΑΡΟΠΟΥΛΑ ■ ΤΡΙΦΥΛΛΙ

● Δόση ανά δεκάριο: 50 - 80 ml

☛ Καταπολεμεί: Αφίδες, πυραλίδα

Δραστική Ουσία: **Lambda-cyhalothrin 5% β/β**

Επιτρέπεται η χρήση του σε: σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, σιταροπούλα

Χρόνος Εφαρμογής: Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών

☛ Καταπολεμεί: Αφίδες, λεπιδόπτερα (σπριβίδια κ.α.), αλευρώδεις, θρίπες

Δραστική Ουσία: **cypermethrin 50% β/ο**

Επιτρέπεται η χρήση του σε: σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, τριτικάλε, βρώμη, spelta, τριφύλλι (μηδική), σιταροπούλα

Χρόνος Εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής

☛ Καταπολεμεί: Αφίδες, βρωμούσες, λεπιδόπτερα κ.α.

Δραστική Ουσία: **deltamethrin 2,5% β/ο**

Χρόνος Εφαρμογής: Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων - προσβολών με μεσοδιαστήματα 7-14 ημερών.

☛ Καταπολεμεί: Αφίδες, κοφτοσκούλικα, λεπιδόπτερα, σκαθάρι των μπιζελιών

Δραστική Ουσία: **deltamethrin 1,51% β/ο**

Χρόνος Εφαρμογής: Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.

Εντομοκτόνα Αποθήκευσης Σιτηρών

DELTA PLUS EC



Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου σε μορφή πολύ χαμηλού όγκου ψεκασμού για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων σε αποθηκευμένα σιτηρά.

☛ Καλλιέργειες / Χώροι:

- ΣΠΟΡΟΙ ΑΠΟ ΣΙΤΑΡΙ, ΚΡΙΘΑΡΙ, ΣΙΚΑΛΗ, ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ, ΒΡΩΜΗ, ΣΠΕΛΤΑ, ΣΙΤΑΡΟΠΟΥΛΑ, ΡΥΖΙ, ΟΣΠΡΙΑ (ΜΠΙΖΕΛΙ, ΦΑΣΟΛΙ, ΦΑΒΑ, ΡΕΒΙΘΙ, ΦΑΚΗ, ΛΟΥΠΙΝΟ)

☛ Καταπολεμεί: Έντομα αποθηκευμένων σιτηρών

Sitophilus sp. (*Sitophilus granarius* - *Sitophilus oryzae*), *Rhyzopertha dominica*, *Tribolium* sp., *Oryzaephilus surinamensis*, *Sitotroga cerealella*

Δραστική Ουσία: **Deltamethrin 98.5% β/β**

Τρόπος Εφαρμογής: Εφαρμογή στους προς αποθήκευση σπόρους, με ψεκασμό χαμηλής πίεσης στον ιμάντα μεταφοράς τους, πριν την εισαγωγή στο χώρο αποθήκευσης (αποθήκες ή σιλό)



Μυκητοκτόνα

AZBANY 250SC



Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση σε εύρος μυκητολογικών ασθενειών.

🌿 **Καλλιέργειες:**

▪ ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ ▪ ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ ▪ ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ
▪ ΚΡΙΘΑΡΙ ▪ ΒΡΩΜΗ ▪ ΣΙΚΑΛΗ

◆ **Δόση ανά δεκάριο:** 100 ml

🚫 **Καταπολεμεί:** Ωίδιο, Σκωρίαση, Σεπτοριώση

Δραστική Ουσία: Azoxystrobin 25% β/ο

Επιτρέπεται η χρήση του σε: σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, τριτικάλε και σίκαλη

Χρόνος Εφαρμογής: Σιτάρι, Βρώμη, Τριτικάλε: Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από το σχηματισμό του 1ου κόμβου μέχρι την έναρξη της ανθοφορίας (BBCH31-61). Κριθάρι, Σίκαλη: Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από το σχηματισμό του 1ου κόμβου μέχρι το τέλος του ξεσταχυάσματος (BBCH31-59).

HELIOSOUFRE 70SC



Μυκητοκτόνο επαφής - ακαρεοκτόνο.

🌿 **Καλλιέργειες:**

▪ ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ ▪ ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ ▪ ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ
▪ ΚΡΙΘΑΡΙ ▪ ΒΡΩΜΗ ▪ ΜΠΙΖΕΛΙ

◆ **Δόση ανά δεκάριο:** 600 ml

🚫 **Καταπολεμεί:** Ωίδιο

Δραστική Ουσία: Sulphur 70% β/ο

Επιτρέπεται η χρήση του σε: σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, τριτικάλε, σόγια, ηλίανθο

Χρόνος Εφαρμογής: Εφαρμογές από την επιμήκυνση στελέχους έως την πλήρη εμφάνιση του σταχυού. (BBCH 30-59).



Προσκολλητικές Ουσίες

HYDROIL



Προσκολλητικό λάδι - Γαλακτωματοποιητής.

◆ **Προτεινόμενη δόση στα 1000 L:** 1L

🌿 **Σύνθεση:** Tween 80% β/β, Μόνο και διγλυκερίδια 30%, Ελαϊκό Οξύ 10%, Γλυκερίνη 5%, Σπορέλαια 45%

SPREMIX



Προσκολλητική Ουσία.

◆ **Προτεινόμενη δόση στα 1000 L:** 1L

Δίχτυα



Η κορυφαία ποιότητα των δικτύων χορτοδεσίας από την Tama (Ισραήλ), τώρα αποκλειστικά στην εταιρεία μας!

- Το μόνο πατενταρισμένο δίχτυ χορτοδεσίας για τέλεια κάλυψη της μπάλας από ΑΚΡΗ ΣΕ ΑΚΡΗ (Net 'Patented' Original EDGE TO EDGE)
- Συμβατό με όλα τα χορτοδετικά μηχανήματα
- Δοκιμάστηκε και εγκρίθηκε από όλους τους κορυφαίους κατασκευαστές χορτοδετικών μηχανημάτων
- Τέλεια κάλυψη της μπάλας κάθε φορά
- Κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες



Διαθέσιμα σε 2 μεγέθη:

Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος Ρολού	Ποσότητα ανά παλέτα
NET018	TAMANET+ 3800 x 1,23m HUV	27.5 cm	28
NET017	TAMANET+ 4500 x 1,23m HUV	29 cm	28

Σπάγγοι




Σπάγγοι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας πλαστικό πολυπροπυλενίου. Με σταθεροποιητή UV κατάλληλο για τις πολύ θερμές συνθήκες της Κύπρου.

Διαθέσιμοι σε 3 χρώματα: Μαύρο, Μπλε και Κεραμιδί.

Κωδικός	Περιγραφή	Μήκος ανά κιλό	Συσκευασία	Εκτιμώμενο μήκος συσκευασίας
NET039E	Baler Twine PP400 Black	400 m / Kg	2 x 5 Kg	4,000 m
NET039G	Baler Twine PP400 Blue	400 m / Kg	2 x 5 Kg	4,000 m
NET040	Baler Twine PP400 Rusty	400 m / Kg	2 x 5 Kg	4,000 m
NET039D	Baler Twine PP600 Black	600 m /Kg	2 x 5 Kg	6,000 m
NET039F	Baler Twine PP600 Blue	600 m /Kg	2 x 5 Kg	6,000 m
NET040A	Baler Twine PP600 Rusty	600 m /Kg	2 x 5 Kg	6,000 m
NET039B	Baler Twine PP750 Black	750 m / Kg	2 x 5 Kg	7,500 m
NET039C	Baler Twine PP750 Blue	750 m / Kg	2 x 5 Kg	7,500 m
NET039H	Baler Twine PP750 Rusty	750 m / Kg	2 x 5 Kg	7,500 m

Φιλμ ενσίρωσης (για μπάλες)



Υψηλής ποιότητας stretch films 5 και 7 στρώσεων. Κατάλληλα για κάθε τύπο τυλιχτικής μηχανής, καθώς επίσης και για στρογγυλές και ορθογώνιες μπάλες σανού.

Λόγω του ότι τα φιλμ αυτά φτιάχνονται από 100% Polyethylene Octene Linear C8, διασφαλίζεται η αντοχή τους στο σχίσιμο και στο τρύπημα. Προσδίδουν ομοιόμορφο τύλιγμα που σφραγίζει και προστατεύει το εσωτερικό της μπάλας για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Διαθέσιμα σε 3 χρώματα: Άσπρο, Μαύρο και Ανοιχτό Πράσινο.

Κωδικός	Περιγραφή	Πλάτος	Μήκος	Πάχος
SOL201	POWERSTRETCH 5 στρώσεων, μαύρο	75 cm	1,500 m	25 m
SOL202	POWERSTRETCH 5 στρώσεων, άσπρο	75 cm	1,500 m	25 m
SOL203	POWERSTRETCH 5 στρώσεων, πράσινο	75 cm	1,500 m	25 m
SOL201A	POWERSTRETCH 7 στρώσεων, μαύρο	75 cm	1,500 m	25 m
SOL202A	POWERSTRETCH 7 στρώσεων, άσπρο	75 cm	1,500 m	25 m

Ασπρόμαυρο Φιλμ ενσίρωσης



ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΦΙΛΜ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΣΑΝΟΥ Silage Black & White

Τα υψηλής ποιότητας υλικά που χρησιμοποιούνται διασφαλίζουν την μέγιστη δυνατή αντίσταση σε σχισίματα και τρυπήματα.

Κωδικός	SOL132	SOL131	SOL133
Πλάτος	12 m	14 m	16 m
Μήκος	Κόβεται ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη		
Πάχος	200 microns		
Χρώμα	Άνω πλευρά: άσπρο, Κάτω πλευρά: μαύρο		



ΦΙΛΜ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ Power DUO

Το διπλό φιλμ ενσίρωσης Power DUO είναι ένα καινοτόμο προϊόν 2 διαφορετικών φιλμ στην ίδια συσκευασία. Το 1ο φιλμ έχει πάχος 150 microns για προστασία, με άσπρο χρώμα στην πάνω επιφάνεια και μαύρο στην κάτω. Το 2ο φιλμ έχει πάχος 40 microns, είναι διάφανο, αδιαπέραστο στο οξυγόνο και προσαρμόζεται στο σχήμα του ενσιρνώματος χωρίς να αφήνει φυσαλίδες οξυγόνου να παγιδευτούν. Οι παγιδευμένες φυσαλίδες οξυγόνου είναι αυτές που αλλοιώνουν και υποβαθμίζουν το ενσίρωμα. Τα δύο φιλμ είναι τυλιγμένα με τέτοιο τρόπο στο ίδιο ρολό, έτσι ώστε να είναι εύκολη η τοποθέτησή τους ακόμα και όταν υπάρχει ελαφρύ αεράκι. Επίσης, είναι 100% ανακυκλώσιμα.

Κωδικός	SOL135	SOL136	SOL137
Πλάτος	12 m	14 m	16 m



ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΧΩΜΑΤΟΣ για στερέωση του φιλμ ενσίρωσης

Ειδικές σακούλες για στερέωση του φιλμ ενσίρωσης. Συστήνεται η τοποθέτησή τους κάθε 80-90 cm. Οι σακούλες έχουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

- Δεν αποθηκεύεται μέσα το νερό της βροχής όπως συμβαίνει με τα ελαστικά αυτοκινήτων, συνεπώς δεν αναπτύσσονται μέσα σε αυτές κουνούπια.
- Χρηάζεται πολύ μικρότερος αριθμός σε σύγκριση με τα ελαστικά αυτοκινήτων.
- Εύκολη μετακίνησή.
- Δεν ρυπαίνεται το περιβάλλον με τα παλιά ελαστικά.

Κωδικός	SOL221
Μέγεθος	120 x 30 cm



UNDERLAYER

Φιλμ διάφανο, αδιαπέραστο στο οξυγόνο που προσαρμόζεται στο σχήμα του ενσιρνώματος χωρίς να αφήνει φυσαλίδες οξυγόνου να παγιδευτούν. Οι παγιδευμένες φυσαλίδες οξυγόνου αλλοιώνουν και υποβαθμίζουν το ενσίρωμα. Είναι το ίδιο υλικό που χρησιμοποιείται στο "Power Duo" μαζί με το διάφανο φιλμ.

Κωδικός	SOL136B	SOL137B
Μέγεθος	14 x 50 m	16 x 50 m
Πάχος	40 microns	35 microns
Χρώμα	Διάφανο	

Μήκος	Κόβεται ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη	
Πάχος	1ο φιλμ: 150 microns, 2ο φιλμ: 40 microns	
Χρώμα	1ο φιλμ: Άνω πλευρά: άσπρο, Κάτω πλευρά: μαύρο - 2ο φιλμ: Διάφανο	

Εμβολιαστής Ενσίρωσης GopriSIL



Το GopriSIL χρησιμοποιείται για την πρόληψη της αύξησης της θερμοκρασίας του σωρού όταν ανοίγεται, με την δημιουργία αναερόβιου περιβάλλοντος που προλαμβάνει την ανάπτυξη αερόβιων μικροοργανισμών (μούχλα, ζύμες), μειώνοντας έτσι τις απώλειες θρεπτικών ουσιών στο ενσίρωμα για τα ζώα.

Η δόση εφαρμογής είναι 1g εμβολιαστή ανά τόνο χορτομάζας (μία συσκευασία των 100 γρ. εφαρμόζεται σε 100 τόνους χορτομάζας).



Διαθέσιμα σε 2 τύπους:

Κωδικός	Περιγραφή	Χρήση
VET001	Gopisil Up	Ιδανικό για όλες τις καλλιέργειες εκτός της μηδικής (τριφύλλι) και σόργου
VET002	Gopisil Total	Ιδανικό για όλες τις καλλιέργειες που προορίζονται για ενσίρωση

Υφασμα Προστασίας Σανού και Αχύρου Polytex



Το PolyTex® είναι ένα πρωτοποριακό ύφασμα προστασίας σανού και αχύρου για μέγιστη ποιότητα και διατηρησιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Κατασκευάζεται από συνεχές νήμα πολυπροπυλενίου υψηλής απόδοσης, με καθοριστικά πλεονεκτήματα σε άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό, όπως:

1. Το νερό της βροχής αποστραγγίζεται με διπλάσια ταχύτητα.
2. Έχει υδατοαπωθητική τεχνολογία για να μην περνά το νερό εύκολα.
3. Διαπερατότητα για γρήγορο στέγνωμα: 40-50% υψηλότερη διαπερατότητα αέρα σε σχέση με άλλα υλικά.
4. Μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής.

Κωδικός	POLYTEX
NET001	POLYTEX ύφασμα προστασίας σανού και αχύρου 12 x 25 m



Κωδικός	Διαθέσιμα αξεσουάρ στερέωματος:
NET001A	FIXTEX S1 - Ταινία στερέωσης υφάσματος (0,05 x 25 m)
NET001B	SILOBAG - Σακούλες για στερέωση
NET001C	Μεταλλικά καρφιά στερέωσης

Φιλμ Δεξαμενής



Το φιλμ δεξαμενής είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό φιλμ μαύρου χρώματος. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να συγκρατεί νερό σε αγροτικές δεξαμενές χωρίς να φθείρεται από την υψηλή ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Διαστάσεις	Πάχος
SOL141	14 m	250 microns



ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΣ



Οθέλλου 11, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου
2540 Δάλι, Λευκωσία - Κύπρος



+357 22 667 908



+357 22 667 157



info@lambrouagro.com.cy



www.lambrouagro.com.cy



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ



Στρόβολος

Λεωφ. Προδρόμου 107,
2064 Στρόβολος
Τ: +357 22 660 171



Λατσιά

Λεωφ. Γ. Κρανιδιώτη 223,
2235 Λατσιά
Τ: +357 22 496 858



Δάλι

Οθέλλου 11,
2540 Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου
Τ: +357 22 300 456



Περιστερώνα

Μόρφου 11,
2731 Περιστερώνα
Τ: +357 22 312 992



Λεμεσός

Λεωφ. Πάφου 186,
4152 Κάτω Πολεμίδια
Τ: +357 25 391 048



Παρεκκλησιά

Ελευθερίας 2,
4520 Παρεκκλησιά
Τ: +357 25 635 373



Πάφος

Λεωφ. Μεσόγης 25,
8280 Μεσόγη
Τ: +357 26 220 758



Λάρνακα

Κων/νου Παλαιολόγου 51,
6036 Λάρνακα
Τ: +357 24 635 933



Κίτι

Δημοσθένους 8,
7550 Βιοτ. Περιοχή Κιτίου
Τ: +357 24 654 552



Σωτήρα

Σταδίου 49,
5390 Σωτήρα
Τ: +357 23 730 660



Ξυλοφάγου

Αναστάση Μανώλη 38,
7520 Ξυλοφάγου
Τ: +357 24 726 616

