

# STIMOFOL

ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ, ΒΙΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΕΣ



# STIMOFOL



MADE IN ITALY

Manufacturer: PROTEO INTERNATIONAL SRL  
Corso IV Novembre, 13 - 12073 CEVA (CN) Italy  
tel - fax: +39 0174 43893  
e-mail: info@proteoint.com - www.proteoint.com

## Σύνθεση:

N-acetyl-thiazolidine-4-carboxylic acid (**ATCA**) 5.0% β/β ισοδύναμο με 5.2% β/ο στους 20 ° C  
Φολικό Οξύ 0.1% β/β ισοδύναμο με 0.104% β/ο στους 20 ° C

To **STIMOFOL** είναι ένα υγρό προϊόν με βιοδιεγερτική δράση, που περιέχει N-acetyl-thiazolidine-4-carboxylic acid (**ATCA**) και Φολικό Οξύ.

Χάρη στη σύνθεση του, το **STIMOFOL** παρέχει ελεύθερα αμινοξέα όπως η προλίνη, που ρυθμίζει την σπαργή των κυττάρων και η κυστεΐνη, που αυξάνει τον μεταβολισμό των φυτών. Όταν εφαρμόζεται σε σπόρους, το **STIMOFOL** όχι μόνο αυξάνει τη δυναμική βλάστησης αλλά επηρεάζει επίσης θετικά τα επόμενα στάδια ανάπτυξης όπως την καρπόδεση, και την διόγκωση των καρπών, αυξάνοντας έτσι την ποιότητα και την ποσότητα παραγωγής κατά τη συγκομιδή.

To **STIMOFOL**, το οποίο συνιστάται για όλες τις καλλιέργειες, μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και μετασυλλεκτικά για την ανάκαμψη του φυτού από το στρες.

Όλα αυτά επιτυγχάνονται με το **STIMOFOL** αφού πρωθεί την πλήρη αξιοποίηση όλων των βιοχημικών αποθεμάτων των φυτών, διεγέροντας τις ζωτικές διεργασίες και βοηθώντας το φυτό να αντεπεξέλθει τις κρίσιμες περιόδους καθόλη την διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης.

To **STIMOFOL** βοηθά τα φυτά να επανέλθουν γρήγορα από συνθήκες στρεσαρίσματος που τυχόν να προκληθούν όπως π.χ. φυτοτοξικότητα, καύσωνα, παγετό, χαλάζι, κατάκλιση νερού και ασφυξίας της ρίζας.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ Κ.ΕΚ./ΔΕΚΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Λουλούδια και καλλωπιστικά	40 – 60	Στην αρχή της βλαστικής ανάπτυξης
Λαχανικά	40 – 60	Μετά τη μεταφύτευση, πριν από την ανθοφορία και μετά την καρπόδεση. Επανάληψη μετά από 15 ή 20 ημέρες
Φυτώρια	20 – 30	Στο 3ο ή 4ο φύλλο
Βιομηχανικές καλλιέργειες	60 – 80	Στην αρχή της βλαστικής ανάπτυξης, κατά την δημιουργία των στελεχών και πριν από την επιμήκυνση του στελέχους όταν εφαρμόζονται ζιζανιοκτόνα. Επανάληψη μετά από 15 ή 20 ημέρες
Οπωρώνες, αμπελώνες, εσπεριδοειδή	70 – 100	Στην αρχή της βλαστικής ανάπτυξης και μετά την καρποφορία. Επανάληψη μετά από 15 ή 20 ημέρες

Οι δόσεις αναφέρονται σε όγκο νερού 100 λίτρα/δεκάριο

Εμβαπτίστε τους σπόρους των ανθεκτικών ειδών σε υδατικό διάλυμα στα 2 % για 12-24 ώρες πριν τη σπορά

**ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ:** Καλή συμβατότητα με σχεδόν όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Με τα προϊόντα που βασίζονται σε ιχνοστοιχεία, μειώστε τη δόση και κάντε μια δοκιμή πριν τη χρήση.

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:** Φυλάσσετε σε ξηρή αποθήκη σε θερμοκρασία 0 - 45 ° C. Μη εύφλεκτο προϊόν. Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιήστε άφθονο νερό και μην το αφήσετε να διαρρέυσει.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:** Αποφύγετε τον ψεκασμό κατά τις πιο θερμές ώρες της ημέρας. Για ευαίσθητες καλλιέργειες ή ποικιλίες, μην το εφαρμόζετε κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ελαφρώς διαβρωτικό προϊόν. Κρατήστε το κλειστό και μακριά από παιδιά, κατοικίδια ζώα, τρόφιμα και ζωτροφές. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.

Η εταιρεία εγγυάται τη σύνθεση, τη παρασκευή και το περιεχόμενο. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για ζημίες (μη αποτελεσματικότητα, ίζηματα από χρήση μη συμβατών προϊόντων κλπ.) που προκαλείται από μερική ή ολική παράβαση των οδηγιών χρήσης.

Distributor: L.Lambrou Agro Ltd

11 Othello street - 2540 Dali Industrial Area - Nicosia

Tel.:+357-22-667908 Fax:+357-22-667157 - www.lambrouagro.com.cy

Net volume

250 cc

E8138A