



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(Ν 141(I)/2011 και Ν 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την αίτηση με αρ. 4693 (Έντυπο 01), ημερομηνίας 14/05/2024, για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος και την επιστολή του αιτητή για χορήγηση άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ελλάδα,

χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **SIMPELL PRO 480 SC** με τα ακόλουθα στοιχεία:

Α) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

4145

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

17/01/2025

Ημερομηνία λήξης άδειας:

15/03/2026

2. Κάτοχος της άδειας:

Nufarm GmbH & Co. KG

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

L. Lambrou Agro Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον
κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

L. Lambrou Agro Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

2. Μορφή:

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη, Φιάλη σε χαρτοκιτίο	10 κ.εκ. έως 1 λίτρο	PET, HDPE

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

4. Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Το spinosad είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με προληπτική και θεραπευτική δράση για την αντιμετώπιση εντόμων των τάξεων Lepidoptera, Diptera Siphonaptera, Thysanoptera, και κάποια Coleoptera σε διάφορες καλλιέργειες και δευτερευόντως για μυζητικά έντομα και ακάρεα. Το spinosad δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα των εντόμων δεσμεύοντας τους υποδοχείς της ακετυλοχολίνης και προκαλεί παρατεταμένη ενεργοποίησή τους, εξαιτίας της οποίας το έντομο παραλύει λόγω νευρομυϊκής κόπωσης. Η παράλυση είναι μη αναστρέψιμη και ο θάνατος των εντόμων επέρχεται μέσα σε τρεις (3) ημέρες.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

Εφαρμόζεται με ψεκασμό καλύψεως φυλλώματος.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Η απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος προστίθεται σε λίγο νερό σε χωριστό δοχείο και ρίχνεται με συνεχή ανάδευση στο βυτίο. Η φιάλη ξεπλένεται 3 φορές και τα νερά ρίχνονται στο βυτίο. Απογεμίζουμε με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

- Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα.
- Ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό.
- Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα.
- Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	γρ. σκ./δεκ. μέγιστη		
Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO	Καρπόκαψα των μήλων <i>Cydia pomonella</i> - CARPPO Νάρκη των γιγαρτοκάρπων <i>Lithocolletis blancardella</i> - LITHBL	20-30	100-125	--	Εφαρμογές σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.	3/ 7-14
	Αχλαδιά** PYUCO	30-35				
Ροδακινιά PRNPS Βερικοκιά PRNAR	Βλαστορύκτης της ροδακινιάς <i>Anarsia lineatella</i> - ANARLI	20	100	--	Εφαρμογές σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.	3/ 7-14
	¹ Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Drosophila suzukii</i> - DROSSU				Ψεκασμοί φυλλώματος. Σε περίπτωση που υπάρχει, να ακολουθείται το σύστημα των γεωργικών προειδοποιήσεων.	
² Χρήσεις ήσσονος σημασίας Δαμασκηνιά PRNDO Κερασιά PRNAV	<i>Drosophila suzukii</i> - DROSSU	20	100	--	Ψεκασμοί φυλλώματος. Σε περίπτωση που υπάρχει, να ακολουθείται το σύστημα των γεωργικών προειδοποιήσεων.	2/ 7-14

Αμπέλι VITVI	Ευδεμίδα <i>Lobesia botrana</i> - POLYBO	10-15	40-120	--	Η εφαρμογή , στην 2 ^η και στην 3 ^η γενιά, μπορεί να γίνει είτε στο μέγιστο των πτήσεων ή στην έναρξη των πτήσεων του εντόμου και επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.	4/ 7-10 ημέρες
	Θρίπας της Καλιφόρνιας <i>Frankliniella occidentalis</i> - FRANOC	20-25	40-80		Η εφαρμογή γίνεται στην έναρξη (10-20%) της ανθοφορίας και όταν υπάρχουν 1-2 θρίπες (κινητές μορφές) ανά τσαμπί και επαναλαμβάνεται	
	<u>¹Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Drosophila suzukii</i> - DROSSU	20	40-80		Ψεκασμοί φυλλώματος. Σε περίπτωση που υπάρχει, να ακολουθείται το σύστημα των γεωργικών προειδοποιήσεων.	4/ 7-14 ημέρες
Τομάτα (Υ) ^{***} LYPES	Φυλλορύκτης <i>Liriomyza</i> sp. - LIRISP	50	50-60	--	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	3/7-10
	Φυλλορύκτης της τομάτας^{***} <i>Tuta absoluta</i> - GNORAB	20-25	50-100			
	<i>Spodoptera</i> sp. - SPODSP	25-30	50-100			
Τομάτα (Θ) ^{***} LYPES	Φυλλορύκτης <i>Liriomyza</i> sp. - LIRISP	50-75	50-150	--	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	3/7-10
	Θρίπας της Καλιφόρνιας <i>Frankliniella occidentalis</i> - FRANOC	20-25	50-150		Η εφαρμογή γίνεται με την παρουσία 2 θρίπων (κινητών μορφών)/ άνθος.	
	<i>Spodoptera</i> sp. - SPODSP	25-30	50-100		Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών.	
	Φυλλορύκτης της τομάτας^{****} <i>Tuta absoluta</i> - GNORAB	20-25	50-100		Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	

Πιπεριά (Θ) CPSAN	Θρίπας της Καλιφόρνιας <i>Frankliniella occidentalis</i> - FRANOC	20-25	50-100	--	Η εφαρμογή γίνεται με την παρουσία 2 θριπών (κινητών μορφών)/ άνθος.	3/10
Αγγούρι (Θ) CUMSA						
Μελιτζάνα (Θ) SOLME						
Φράουλα (Θ) FRAAN	Θρίπας της Καλιφόρνιας <i>Frankliniella occidentalis</i> - FRANOC	20-25	50-100	--	Η εφαρμογή γίνεται όταν υπάρχουν 1-2 θρίπες (κινητές μορφές) ανά άνθος.	3/10
	<u>¹Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Drosophila suzukii</i> - DROSSU	20	50-100	--	Ψεκασμοί φυλλώματος.	3/7-14
Βαμβάκι GOSHI	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> - HELIAR	15-20 (κ.εκ/δεκ)	50-80	--	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών.	3/10
	<u>¹Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> - LAPHFR					
Πατάτα SOLTU	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> - LPTNDE	5	100	--	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών.	3/7-10
² Χρήση ήσσονος σημασίας Φιστικιά PIAVE	Ψύλλα της φιστικιάς <i>Agonoscena</i> sp. - AGONSP	30	100	--	Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση ωών και νυμφών στα φύλλα.	3/14-21
² Χρήση ήσσονος σημασίας Σπανάκι SPQOL	Θρίπας <i>Thrips tabaci</i> - THRITB Θρίπας της Καλιφόρνιας <i>Frankliniella occidentalis</i> - FRANOC	20-25	40-80	--	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων ενηλίκων.	3/7-10

² Χρήση ήσσονος σημασίας Ρόκα ERUVE	Θρίπας της Καλιφόρνιας <i>Frankliniella occidentalis</i> - FRANOC	20-25	40-80	--	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών.	3
² Χρήσεις ήσσονος σημασίας Βατόμouro (Θ) RUBSS Σμέουρο (Θ) RUBID Μύρτιλλο (Θ) VACSS	<i>Drosophila suzukii</i> - DROSSU	20	50-100	--	Ψεκασμοί φυλλώματος.	2/7-14
Μαρούλι (Υ) LACSA	² Χρήση ήσσονος σημασίας: Προνύμφες Λεπιδόπτερων <i>Heliothis armigera</i> - HELIAR	20-25	40-80	--	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών.	2/7-10
² Χρήση ήσσονος σημασίας: Γλυκοπατάτα IPOBA	<i>Durponchelia fovealis</i> DUPOFO	5	100	--	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών.	3/7-10

Παρατηρήσεις:

* Η δόση είναι ανάλογη της πυκνότητας του πληθυσμού των εντόμων.

** Συνιστάται συνδυασμός με παραφινικό λάδι στη δόση 250 κ.εκ./hl στην αχλαδιά για αντιμετώπιση της ψύλλας *Psylla pyri*, για αύξηση της αποτελεσματικότητας.

*** Στην τομάτα, αγγού και θερμοκηπίου, για την αντιμετώπιση του φυλλορύκτη, το σκεύασμα μπορεί να εφαρμοστεί στη δόση 35-50 κ.εκ./ σκευάσματος/hl σε συνδυασμό με παραφινικό λάδι στη δόση 300 κ.εκ./hl.

**** Μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με παραφινικό λάδι (Simpell Pro 480 SC 20-25 κ.εκ. σκευάσματος/hl + 250-300 κ.εκ. σκ./hl παραφινικό λάδι).

****Επανάληψη εφαρμογής εφόσον βρέξει μέσα σε 4 ώρες.

- Η χρήση στην κερασιά περιλαμβάνει τη βυσσινιά.
- Η χρήση στο μαρούλι περιλαμβάνει τα κατσαρά μαρούλια, τα μαρούλια σαλάτες, τα κεφαλωτά μαρούλια και τα κοινά μαρούλια.

¹«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του *Drosophila suzukii* στις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της βερικοκιάς, του αμπελιού και της φράουλας και κατά του *Spodoptera frugiperda* στην καλλιέργεια του βαμβακιού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

²«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της δαμασκηνιάς, της κερασιάς, της βυσσινιάς, της φιστικιάς, του σπανακιού, της ρόκας, του βατόμουρου, του σμέουρου, του μύρτιλλου, του μαρουλιού και της γλυποτατάτας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας (ημέρες)
Μηλιά, Αχλαδιά (εφαρμογή για καταπολέμηση της καρπόκαψας και νάρκης), Ροδακινιά, Βερικοκιά, Πατάτα, Δαμασκηνιά, Κερασιά-Βυσσινιά, Σμέουρο, Βατόμουρο, Μύρτιλλο, Φιστικιά, Γλυκοπατάτα	7
Αχλαδιά (εφαρμογές για καταπολέμηση της ψύλλας), Αμπέλι	14
Τομάτα (Υ/Θ), Αγγούρι (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Πιπεριά (Θ), Σπανάκι, Ρόκα, Μαρούλι (Υ)	3
Φράουλα	1
Βαμβάκι	21

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης - IRAC: spinosad: 5

Προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται:

1. η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα.
2. Εφαρμογή μη χημικών μεθόδων και πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης ώστε να διατηρηθεί ο πληθυσμός των εντόμων στόχων σε χαμηλά επίπεδα.
3. Επεμβάσεις όταν ο πληθυσμός των εντόμων-στόχων είναι σε χαμηλά επίπεδα.
4. Πλήρη κάλυψη των φυτών (φύλλα, καρποί) με το ψεκαστικό υγρό.
5. Εφαρμογή των εγκεκριμένων δόσεων και όχι μικρότερων.
6. Εως δύο (2) εφαρμογές ανά γενεά του κάθε εντόμου-στόχου και εναλλαγή για την επόμενη γενεά με εντομοκτόνα άλλων χημικών ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Προφυλάξεις για ασφαλή χρήση του σκευάσματος σε προγράμματα IPM στα θερμοκήπια:

- Έκθεση των βομβίνων, παρασιτοειδών υμενοπτέρων και αρπακτικών εντόμων και ακάρεων σε απευθείας ψεκασμό με το σκεύασμα μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.
- Να μη γίνεται εξαπόλυση βομβίνων για 24 ώρες μετά την εφαρμογή, καθώς επίσης παρασιτοειδών και αρπακτικών εντόμων και ακάρεων για 1-2 εβδομάδες μετά την εφαρμογή.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες χρήσεις όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one και 2-methylisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι και μπότες.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας **20 μέτρων** για τις δένδρως καλλιέργειες και **15 μέτρων** για τις υπόλοιπες καλλιέργειες από τα επιφανειακά ύδατα.

SPe3: Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας **3 μέτρων** από μη γεωργική γη.

SPe3: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά τη χρήση του προϊόντος και επί 1 μέρα μετά τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. Η απόφαση για το εάν προκληθεί ή όχι εμετός θα ληφθεί από το γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μετακινείστε τον ασθενή σε καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε μέρος δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως τα δοχεία με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: ...17/01/2025...

Σφραγίδα

Δρ Μάκης Αντωνιάδης
Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας